

## **INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RCM PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

### **NOME DO MEDICAMENTO:**

Milid 300 mg cápsulas; Milid 300 mg comprimidos dispersíveis.

### **COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA**

300 mg de erdoesteína. Os comprimidos dispersíveis contêm 252,5 mg de lactose mono-hidratada e 10 mg de Laca de amarelo sunset (E110).

### **FORMA FARMACÊUTICA:**

Cápsulas e comprimidos dispersíveis.

### **INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS:**

Tratamento de infeções respiratórias agudas e exacerbações de DPOC na presença de hipersecreção.

### **POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO:**

1 cápsula ou 1 comprimido dispersível 2-3 vezes por dia por via oral. O tratamento não deve exceder os 10 dias.

### **CONTRAINDICAÇÕES:**

Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes. Doentes com úlcera péptica ativa. Doentes com cirrose hepática e deficiência da enzima cistationina-sintetase. O uso de erdoesteína não é recomendado em doentes com insuficiência renal com depuração da creatinina <25 ml/min ou em doentes com insuficiência hepática grave. Milid é contraindicado em crianças com idade inferior a 2 anos.

### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO:**

A presença eventual de um odor sulfuroso não indica a alteração do produto mas sim a presença da substância ativa. Em doentes com insuficiência hepática leve a dose diária não deve exceder os 300 mg. População pediátrica: os mucolíticos podem causar obstrução brônquica em crianças com idade inferior a 2 anos. A capacidade de drenagem do muco brônquico é limitada neste grupo, devido às características fisiológicas do trato respiratório. Milid não deve ser utilizado em crianças com idade inferior a 2 anos. Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de lactase ou malabsorção de glucose-galactose não devem tomar este medicamento. Milid comprimido dispersível contém Laca de amarelo sunset (E110) que pode causar reações alérgicas.

### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS FORMAS DE INTERAÇÃO:**

Não foram notificadas interações com outros medicamentos e, portanto, Milid pode ser associado a antibióticos e broncodilatadores.

### **EFEITOS ADVERSOS:**

Menos de 1000 doentes apresentaram efeitos gastrointestinais indesejáveis. Efeitos muito raros: cefaleias, dispneia, alterações do paladar, náusea, vômito, diarreia, dor epigástrica, urticária, eritema e eczema. Efeitos com frequência desconhecida: Obstrução brônquica.

**Para informação completa consultar o RCM do medicamento.** Medicamento Não Sujeito a Receita Médica. Para mais informações deverá contactar o Titular da Autorização de Introdução no Mercado. Titular da AIM: BGP Products, Unipessoal Lda., Avenida D. João II, Edifício Atlantis, N° 44C - 7.3 e 7.4, 1990 - 095 Lisboa, uma empresa Mylan. **E-mail da farmacovigilância:** pv.portugal@viatris.com

**Data da última revisão:** dezembro de 2018